



# MESURES D'HYGIENE A APPLIQUER EN CAS DE COVID-19 DANS LES SECTEURS INTERVENTIONNELS

## 1. OBJET

Description de la conduite à tenir lors de la prise en charge d'un cas possible ou confirmé de COVID-19.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

Secteurs interventionnels amenés à prendre en charge un patient Covid-19

## 3. REFERENTIELS

- Avis du Haut Conseil de la Santé Publique, Réduction du risque de transmission du coronavirus SARS-CoV-2 par la ventilation et gestion des effluents des patients, 17 mars 2020
- Ministère de la santé : Guide de préparation au stade épidémique de COVID-19 en établissement de santé – 16/03/20.
- Propositions pour la **prise en charge anesthésique** d'un patient suspect ou infecté à Coronavirus COVID-19 – **SFAR** – 13/03/20
- AVIS : **Société française d'hygiène hospitalière SF2H** - Relatif aux indications du port des **masques chirurgicaux** et des appareils de protection respiratoire de type FFP2 pour les professionnels de santé - 04 mars 2020
- **Santé publique France** : Conduite à tenir - Surveillance des patients suspects d'infection due au SARS-CoV-2 (COVID-19) - *Mise à jour le 04/03/2020*

## 4. DOCUMENTS ASSOCIES

- Règles d'utilisation des masques – HCC – Site intranet/ Accueil/ Espace intranet Covid-19
- Autres documents et affiches Covid-19 – Site intranet/ Accueil/ Espace intranet Covid-19
- Hygiène des mains (Chap. 01 n°01)
- Précautions complémentaires en service de soins (Chap. 10 n°02)

## 5. CONTAGIOSITE ET MODE DE TRANSMISSION

Le virus responsable de la maladie COVID-19 se transmet par **Contact** et **Gouttelettes** émises par un patient malade (postillons, toux), en particulier lors de contacts étroits. A ce titre, les masques chirurgicaux/de soins sont adaptés.

Les masques FFP2 seront réservés exclusivement aux personnels soignants qui réalisent des manœuvres respiratoires à risque d'aérosolisation.

En période d'épidémie Covid-19, durées de port des masques recommandées en l'absence de souillure visible :

- 3 h pour les masques de soins/chirurgicaux,
- 4 h pour les FFP2.

Ils peuvent être gardés entre plusieurs patients.



## MESURES D'HYGIENE A APPLIQUER EN CAS DE COVID-19 DANS LES SECTEURS INTERVENTIONNELS

Date de révision : 18/05/20

### 6. PRISE EN CHARGE DU PATIENT SUSPECT OU COVID-19 EN SECTEUR INTERVENTIONNEL

Pour tout renseignement, joindre l'équipe opérationnelle d'hygiène au 2.46.59.  
(Semaine : 8h-17h / week end : 10h-14h). Mail : hygiene@ch-colmar.fr

<b>Salle d'intervention</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas modifier le traitement d'air du secteur : conserver la pression positive dans les salles d'intervention, ne pas ouvrir les fenêtres</li> <li>- Limiter le matériel présent en salle. Minimum de matériel stérile nécessaire et dans des armoires fermées ou à distance</li> <li>- Limiter le nombre de personnel en salle</li> <li>- Limiter les allées/venues et les ouvertures des portes au strict nécessaire</li> <li>- Prévoir une personne pour approvisionner en cas de besoin</li> </ul>
<b>Patient</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Port du masque de soin par le patient à l'arrivée au secteur interventionnel et pendant toute la durée de la prise en charge en cas d'anesthésie locale</li> <li>- Circuit patient : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Accueil direct du patient en salle d'intervention (ou d'induction)</li> <li>o Réveil en salle d'intervention (ou d'induction).</li> </ul> </li> </ul> <p>Dans certains blocs, un circuit « patient Covid-19 » est pré-défini, avec salle dédiée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En cas d'oxygénothérapie au masque ou aux lunettes, faire porter au patient un masque chirurgical/de soins (y compris en salle d'intervention).</li> </ul>
<b>Tenue des personnels prenant en charge le patient à l'accueil</b>	<p>Masque chirurgical, lunettes de protection, charlotte, tenue de protection</p>
<b>Gants non stériles à usage unique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Uniquement si</b> situation de contact ou de risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, une muqueuse ou la peau lésée = <b>précautions standard.</b></li> <li>- Friction hydro-alcoolique des mains</li> </ul>
<b>Tenue des personnels en salle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Personnels d'anesthésie</b> (intubation/extubation/aspiration trachéale) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Anesthésiste et IADE (et personnels assistant les personnels d'anesthésie lors de l'intubation, le cas échéant)</u> : masque FFP2, lunettes de protection, charlotte, tenue de protection</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Personnels de bloc/radiologie interventionnelle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Chirurgiens, IBO instrumentistes, radiologues</u> : tenue chirurgicale habituelle (y compris masque chirurgical (FFP2 si chirurgie thoracique avec résection pulmonaire, chirurgie ORL, chirurgie endo-buccale, neurochirurgie de la base du crâne, bronchoscopie rigide) + port de lunettes de protection). Si aide à l'installation du patient : tenue de protection (à retirer après installation)</li> </ul> </li> </ul>



HOPITAUX CIVILS  
DE COLMAR

FICHE EOH

# MESURES D'HYGIENE A APPLIQUER EN CAS DE COVID-19

## DANS LES SECTEURS INTERVENTIONNELS

Date de révision : 18/05/20

	<p>- <u>IBO circulant, MER</u> : tenue habituelle (y compris masque chirurgical) + port de lunettes de protection et tenue de protection lors des mobilisations du patient (à retirer après mobilisation + FHA). Pour la réalisation de soins souillants/mouillants utiliser en plus de sa tenue un tablier plastique à usage unique, patient unique à jeter après usage en DASRI. Réaliser ensuite une HDM à la SHA</p> <p><i>Après utilisation :</i></p> <p>⇒ <i>Sarrau de protection ou chirurgical (si non visiblement souillé) à éliminer en double emballage sac « cristal » transparent marqué d'une croix (à destination de la blanchisserie).</i></p> <p>⇒ <i>Lunettes de protection à désinfecter avec une chiffonnette imprégnée de dD pour réutilisation</i></p>
<b>Matériel</b>	<p>Désinfection rigoureuse des dispositifs médicaux après utilisation avec une chiffonnette imprégnée de dD ⇒ Procédures habituelles</p>
<b>Entretien des locaux</b>	<p>- Après la sortie du patient, évacuer le linge, le cas échéant, sans le secouer - Attendre 15 minutes avant la réalisation du bionettoyage. Puis procédure habituelle :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Soit entre deux</li><li>- Soit fin de programme (murs à hauteur d'homme)</li></ul> <p>⇒ Tenue ASH : masque chirurgical + tenue habituelle (tenue de protection) - Réutilisation de la salle pour un autre patient</p>
<b>Déchets</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elimination en DASRI</li></ul>
<b>Gestion du linge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manipuler le linge en tenue de protection identique à celle en présence du patient.</li><li>• NE PAS SECOUER les draps et le linge ni le plaquer contre soi</li><li>• Emballer le linge dans un sac opaque blanc (sans tri) fermé hermétiquement</li><li>• Placer ce premier sac dans un second sac opaque blanc propre en veillant à ne pas contaminer l'extérieur de ce deuxième sac.</li><li>• Marquer une croix visible au marqueur sur le sac pour identification en blanchisserie.</li></ul>
<b>Gestion des excréta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si besoin d'un bassin pour les selles : matériel de gestion des excréta à usage unique à éliminer en DASRI, à défaut, garnir le bassin d'un sac poubelle tapissé de cellulose. Eliminer le sac en DASRI. Désinfection bassin</li><li>• Si changes complets : éliminer en DASRI</li></ul>
<b>Transport</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Patient : masque de soins + HDM à la SHA.</li><li>• Transporteur : port masque de soins et tablier plastique. HDM à la SHA avant et après prise en charge. Elimination du tablier après prise en charge</li></ul>



HOPITAUX CIVILS  
DE COLMAR

FICHE EOH

## MESURES D'HYGIENE A APPLIQUER EN CAS DE COVID-19 DANS LES SECTEURS INTERVENTIONNELS

Date de révision : 18/05/20

### 7. CONDUITE A TENIR EN SALLE DE PAUSE/DETENTE

<b>Salle de pause</b>	<p><b>Systematiquement :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vérifier le nombre restreint de personnel dans la salle (permettant le respect des distances de sécurité)</li><li>- Retirer les équipements de protection à l'extérieur de la salle</li><li>- Réaliser une Hygiène Des Mains (HDM)</li><li>- Respecter les distances de sécurité</li><li>- HDM avant de manger</li><li>- HDM en sortant de la salle</li><li>- Aérer la salle si possible.</li><li>- Bionettoyage des surfaces au dD.</li></ul> <p>Pour le <b>personnel symptomatique</b> ou le <b>personnel avec antécédent de COVID &lt; 21 j (début des signes)</b> : réaliser la pause en l'absence des autres personnels et bionettoyage des surfaces au dD au départ.</p>
---------------------------	---