

Comme chaque hiver l'épidémie saisonnière de grippe va toucher la France. Mais cette année, grippe et COVID séviront ensemble, ce qui engendrera :

- Des difficultés de différenciation entre les symptômes grippaux et ceux de la COVID 19,
- Un affaiblissement de votre système immunitaire post grippal, voire des risques de co-infection.

COVID-Grippe
ne feront pas
bon ménage....



Pour vous protéger et
protégez les autres :
vaccinez-vous contre la
grippe.

VACCINEZ-VOUS

en participant à notre grande tombola
organisée par les H.C.C.

OÙ ME FAIRE
VACCINER ?



- Vous exercez dans un pôle de soins ? Vous pouvez vous faire vacciner directement dans votre service.
- Vous exercez hors pôle de soins ? Profitez des permanences mises en place **à partir du 27 octobre**, entre 12h00 et 14h00, les mardis et jeudis, par le service de santé au travail, au **restaurant du personnel**.
- Par ailleurs, pour toute situation le nécessitant, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec le **service de santé au travail** qui vous vaccinera.

Afin de faciliter l'accès à
la vaccination, les HCC
mettent en place une
organisation innovante :



Vous retrouverez toutes les
informations actualisées de
cette campagne sur le site
intranet des HCC.

Le plus cette année :
**en vous vaccinant, participez à une grande tombola
gratuite avec des centaines de lots à gagner...**

**Contre la COVID-19, on attend un vaccin,
contre la grippe, on en a déjà un !**



PROTCOLE DE VACCINATION ANTI-GRIPPALE

La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée pour les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère. Les professionnels de santé sont prioritaires car ils sont les piliers de la prise en charge de publics fragiles.

➤ VERIFICATION DE L'ABSENCE DE CONTRE-INDICATIONS

- Prendre connaissance du document d'information « Vaccin VAXIGRIP TETRA® ».
- Réaliser l'interrogatoire de la personne souhaitant être vaccinée à l'aide du questionnaire.
- En cas de réponse positive, la vaccination sera réalisée au Service de Santé au Travail (poste 2 40 85)

➤ MODE ET VOIES D'ADMINISTRATION

- Sortir le vaccin du réfrigérateur.
- Amener le vaccin à température ambiante avant injection.
- Agiter avant emploi.
- Inspecter visuellement avant administration : ne pas utiliser si des particules étrangères sont présentes dans la suspension (liquide opalescent).
- Injecter par voie intramusculaire dans le muscle deltoïde.
- ➔ *Le vaccin ne doit pas être administré en intravasculaire.*

➤ PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE LA VACCINATION

Comme tous les vaccins, une réaction anaphylactique est possible.

Il est donc indispensable d'avoir à disposition un chariot d'urgence et les coordonnées d'un médecin du service facilement joignable en cas d'urgence.

En cas de malaise post vaccinal :

- Allonger la personne
- Prévenir un médecin du service.
- Contrôler les constantes : Tension, pouls, fréquence respiratoire.
- Appeler le 15 en cas de nécessité.

➤ DONNER UN TICKET DE TOMBOLA A L'AGENT VACCINE

➤ TRACABILITE

- Compléter le tableau de traçabilité en précisant le numéro de lot du vaccin.
- Envoyer le tableau au Service de Santé au Travail sous pli confidentiel.



INTERROGATOIRE AVANT VACCINATION ANTI-GRIPPALE

➤ Avez-vous déjà présenté une réaction allergique sévère aux œufs, ovalbumine, protéines de poulet ou aux autres composants du vaccin : néomycine (aminoside), formaldéhyde (formol), octoxinol-9 ou excipients ?

NON

OUI

➤ Avez-vous aujourd'hui de la fièvre ou une infection en cours ?

NON

OUI

➤ Avez-vous été en contact à risque avec un cas de COVID-19 positif dans les 14 derniers jours ?

NON

OUI

➤ Prenez-vous une corticothérapie per os, des anti-coagulants, une biothérapie, ou des immunosuppresseurs ?

NON

OUI

➤ Avez-vous une maladie chronique actuellement évolutive ?

NON

OUI

➤ Autres questions :

NON

OUI



Si une réponse « OUI »
ou **besoin d'informations complémentaires**



Contactez le Service de Santé
au Travail (SST) au 24085
(Le vaccin sera réalisé au SST)



Vaccin VAXIGRIP TETRA®

Vaccin antigrippal quadrivalent à virion fragmenté, inactivé.

Informations générales

• **CONTRE- INDICATIONS :**

- La vaccination doit être différée en cas de maladie fébrile ou d'infection aigue.
- Hypersensibilité aux substances actives, à l'un des excipients* ou à tout autre composant pouvant être présent dans le vaccin à l'état de traces comme les œufs (ovalbumine ou protéines de poulet), formaldéhyde, néomycine et l'octoxinol-9.

* chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique dihydraté, phosphate monopotassique et eau ppi.

• **EVENEMENTS INDESIRABLES TRES FREQUENTS A FREQUENTS :**

Maux de tête, douleurs musculaires, malaise, frissons, fièvre.

Réactions locales au point d'injection : douleur, rougeur, gonflement, induration,.

Ces réactions disparaissent généralement en 1 à 3 jours, sans traitement.

• **EFFETS INDESIRABLES PEU FREQUENTS, RARES OU DE FREQUENCE INDETERMINEE :**

Fatigue, diarrhées, nausées, ecchymose/ prurit/ chaleur au site d'injection, lymphadénopathie, paresthésie, somnolence, sensation vertigineuse, dyspnée, asthénie, syndrome pseudo-grippal, inconfort au site d'injection, arthralgies, hypersensibilité, réactions allergiques telles que angioedème, dermatite allergique, prurit généralisé, urticaire, prurit, érythème, hyperhidrose, réactions anaphylactiques.

• **GROSSESSE / ALLAITEMENT**

Le vaccin peut être administré à tous les stades de la grossesse et en cas d'allaitement.

• **PHARMACODYNAMIE**

La séroprotection est généralement obtenue dans les 2 à 3 semaines.

La vaccination annuelle est recommandée en raison de la durée d'immunité et de la possible variation des souches virales.

• **CONSERVATION ET MODE D'ADMINISTRATION**

Le vaccin doit être conservé au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C) et à l'abri de la lumière dans son emballage.

Il doit être amené à température ambiante avant injection. Agiter avant emploi.

Inspecter visuellement avant administration : ne pas utiliser si des particules étrangères sont présentes dans la suspension (liquide opalescent).

Injecter par voie intramusculaire dans le muscle deltoïde de préférence, ou en sous-cutané.

SERVICE : _____

TRACABILITE VACCINATION ANTI-GRIPPALE

MEDECIN REFERENT : _____

VAXIGRIP TETRA 2020 - 2021



HOPITAUX CIVILS
DE COLMAR

AVANT L'INJECTION,

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU DOCUMENT D'INFORMATION ET D'INTERROGATOIRE.

Date Vaccin	NOM PRENOM	Date de naissance	Informations vaccinales reçues ET interrogatoire réalisé (OUI / NON)	Signature agent	Nom ET Signature du réalisateur	Numéro de lot vaccin

Document à renvoyer au Service de Santé au Travail