

- **En prophylaxie PRE-exposition ou POST-exposition de la COVID-19**
 ❖ Résumé des caractéristiques du produit

1. Présentation

Casirivimab et Imdevimab : solutions transparentes à légèrement opalescentes, incolores à jaune pâle.

| | Casirivimab | Imdevimab |
|---------------------------|--|--|
| Flacon 20ml (120mg/ml) | 1332mg (11,1ml)  | 1332mg (11,1ml)  |
| Flacon 6ml (120mg/ml) | 300mg (2,5ml)  | 300mg (2,5ml)  |

2. Posologie

a) Prophylaxie post-exposition :

- dose unique de 600mg de Casirivimab et 600mg d'Imdevimab administrés ensemble en une seule perfusion IV (par pompe ou gravité)

b) Prophylaxie pré-exposition :

- dose initiale de 600mg de Casirivimab et 600 mg d'Imdevimab administrés ensemble en une seule perfusion IV (pompe ou gravité)
- en cas d'exposition continue ou prolongée au SARS-CoV-2, réitérer l'administration de l'association Casirivimab et Imdevimab : **toutes les 4 semaines, une dose de 300 mg de Casirivimab et 300 mg d'Imdevimab par perfusion IV ou injection SC si IV impossible**


3. Conservation des flacons ou seringues

- Flacons fermés : entre +2°C et +8°C
- Flacons multidoses 20ml entamés : 16h à T° ambiante ou 48h max. entre +2°C et +8°C
- Flacons 6ml à usage unique : jeter tout produit restant
- Après dilution dans la poche de NaCl : 4h à T° ambiante ou 36h au réfrigérateur
- Seringues : maximum 24h entre +2°C et +8°C, puis mise à T° ambiante avant injection.

4. Préparation : Mise à T° ambiante des flacons 20mn avant préparation. Ne pas agiter.

a) Administration IV posologie 600mg + 600mg (volume total 10ml)

utiliser 2 seringues distinctes



Perfusion de 30mn, puis rincer la tubulure. Surveillance 1h après la fin de la perfusion.

b) Administration IV posologie 300mg + 300mg (volume total 5ml)

utiliser 2 seringues distinctes



Perfusion de 30mn, puis rincer la tubulure. Surveillance 1h après la fin de la perfusion.

4. Préparation : Mise à T° ambiante des flacons 20mn avant préparation. Ne pas agiter.

c) Administration SC (si IV impossible) posologie 300mg + 300mg (volume total 5ml)


Prélever avec 2 seringues Luer Lock (LL) distinctes, aiguilles 21G



Administrer avec aiguilles 25G

Administrer les seringues consécutivement chacune à un site d'injection différent :

- cuisse
- partie supérieure de l'arrière du bras
- abdomen (à l'exception d'une zone de 5 cm autour du nombril et de la zone de la ceinture).



Surveillance 1h après la fin de l'administration