

MESURES D'HYGIENE A APPLIQUER EN CAS DE COVID-19

1. Objet / objectif / domaine d'application

Description de la conduite à tenir suite à un cas possible ou confirmé de COVID-19.

2. Transmission

Le virus responsable de la maladie COVID-19 se transmet essentiellement par **Gouttelettes** émises par un patient malade (postillons, toux), en particulier lors de contacts étroits et par **Contact**.

Toute manœuvre à risque au niveau de la sphère respiratoire entraîne un possible risque de transmission **Air**.

3. Mesures d'hygiène

Habillage du personnel	<p>Dès l'entrée dans l'unité COVID/entrée en chambre (après avoir réalisé une HDM à la SHA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenue de protection • Lunettes de protection • Masque chirurgical ou FFP2 (Cf affiche « règles d'utilisation des masques » sur intranet) <p>→ ces équipements sont à conserver (sauf spécification médicale différente) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre tous les patients en unité COVID-19 - Entre plusieurs patients COVID-19 dans des chambres contiguës dans les autres services. <p>Retrait et élimination de la tenue de protection :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant de sortir de la chambre d'un patient COVID-19 (dans les unités prenant en charge un patient COVID-19 isolément). - Après la prise en charge du dernier patient COVID-19 (dans les unités prenant en charge plusieurs patients COVID-19 regroupés géographiquement) - Pour accéder à la salle de détente ou à l'office dans les unités COVID-19 - En sortant de l'unité COVID-19 <p>→ Elimination en DAOM</p> <p>→ Réaliser une HDM à la SHA après retrait des équipements.</p> <p>→ Lunettes à désinfecter par trempage dans dD ou à passer à la chiffonnette imprégnée de dD pour réutilisation</p> <p>Dans les unités COVID-19 : pour la réalisation de soins souillants/mouillants utiliser en plus de sa tenue un tablier plastique à <u>usage unique / patient unique</u>, à jeter après usage en DAOM.</p>
-------------------------------	---

REDACTEUR(S)	VERIFICATEUR(S)	APPROBATEUR(S)
IDE EOH	PH EOH	Dr MARTINOT, président du CLIN



Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.

MESURES D'HYGIENE A APPLIQUER EN CAS DE COVID-19

Réf. : Erreur ! Source du envoi introuvable.
Version : Erreur ! Source du envoi introuvable.
Application : Erreur ! Source du envoi introuvable.

Page 2 sur 3

	Masque FFP2	<ul style="list-style-type: none">• Si risque d'aérosolisation respiratoire, port d'un masque FFP2 par le personnel : intubation, extubation, aspiration trachéale et autres prélèvements respiratoires (dont prélèvement diagnostique), kiné respiratoire, fibroscopie bronchique, ventilation artificielle par insufflation manuelle au BAVU, VNI, oxygénothérapie > 6 L/mn, Optiflow®, Trachéotomie (pose et changement de canule), aérosols médicamenteux (pendant l'aérosol et jusqu'à 3h après si pas d'aération, ou 20 min si aération de la chambre fenêtre ouverte porte fermée après aérosol).• Pendant la période « PLAN CANICULE », si un ventilateur/climatiseur est en fonction dans la chambre d'un patient COVID-19 positif confirmé.
	Gants UU	Uniquement si situation de contact ou risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, une muqueuse ou la peau lésée = précautions standard .
Patient	Chambre	Prise en charge en chambre seule (ou cohorté en chambre double quel que soit le variant) et maintenir si possible la porte fermée . Aérer le plus souvent possible et idéalement 10 min toutes les heures. Dans les services prenant en charge plusieurs patients COVID-19 (hors unité COVID-19), les patients devront, dans la mesure du possible, être regroupés géographiquement.
	Masque de soins	<ul style="list-style-type: none">• Recommandé en chambre double• Dès l'entrée d'un personnel• Impérativement en cas de toux, oxygénothérapie au masque / lunettes ou soin rapproché• Systématique si sortie de la chambre (ex : examens, transfert).
	HDM à la SHA	<i>A minima</i> si sortie de la chambre (ex : examens) Avant la mise en place d'un saturomètre sur le doigt...
Dispositifs médicaux	<ul style="list-style-type: none">• Privilégier l'usage unique• A défaut désinfection rigoureuse des dispositifs médicaux dès leur sortie de la chambre à la chiffonnette imprégnée de dD ou d'alcool modifié (stéthoscope, garrot...)	
Linge	Gestion du linge habituelle.	
Vaisselle	Gestion de la vaisselle habituelle	
Déchets	Tri habituel	
Gestion des excreta	<ul style="list-style-type: none">• Si le patient est valide, il utilise les toilettes de sa chambre• Si besoin d'un bassin pour les selles : matériel de gestion des excreta à usage unique à éliminer en DASRI, à défaut, garnir le bassin d'un sac poubelle tapissé de cellulose, à éliminer en DASRI.• Si changes complets : éliminer en DASRI	

	Erreur ! Source du renvoi introuvable.	Réf. :	Erreur ! Source du renvoi introuvable.
	Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable.	Version :	Erreur ! Source du renvoi introuvable.
	MESURES D'HYGIENE A APPLIQUER EN CAS DE COVID-19	Application :	Erreur ! Source du renvoi introuvable.
			Page 3 sur 3

Entretien de la chambre	Entretien habituel
Au départ du patient	<ul style="list-style-type: none"> • Bionettoyage dès la sortie du patient et l'élimination du linge (aération durant la durée de l'entretien de la chambre) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Tenue de l'ASH : tablier plastique + masque de soins/chirurgical. ○ Selon procédure habituelle • Réutilisation de la chambre pour un autre patient possible ensuite.
Visiteur	<ul style="list-style-type: none"> • Visites pour les patients COVID-19 sur dérogation du médecin du service notamment pour les patients en fin de vie. • Tenue de protection identique à celle du personnel.
Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Patient : masque de soins/chirurgical + HDM à la SHA. • Transporteur : port masque de soins/chirurgical et tablier plastique. HDM à la SHA avant et après prise en charge (élimination du tablier après la prise en charge).

4. Conduite à tenir en salle de pause/détente

Cf affiche : « Consignes pour la salle de pause ».

5. Documents de référence / associés

- Ministère de la santé.
- Société française d'hygiène hospitalière SF2H
- Santé publique France
- Haut Conseil de la Santé Publique
- REPIAS : <https://www.preventioninfection.fr/informations-sur-lepidemie-de-nouveau-coronavirus-2019-ncov/>

Objet de la révision	V11 réactualisation suite à recommandations SF2H 02/2022
	V12 modification gestion des excréta